


品目:ブドウ / 果実の着色不良



品種:デラウエア
発生時期:2002.5?

作物体の無機成分量

農家	地目	畑	障害	P	K	Ca	Mg	Mn	Fe	B	Zn
				----- (%) -----		-----		----- (ppm) -----			
果実	A	畑	障害	0.17	1.04	0.063	0.044	15	18	13	3.7
	A	田	障害	0.13	1.13	0.064	0.043	9	12	16	3.8
	B	田	正常	0.07	0.87	0.033	0.034	27	14	11	3.1
葉	A	畑	障害	0.66	0.71	2.71	0.15	748	106	19	43
	A	田	障害	0.20	0.68	2.39	0.14	495	81	21	42
	B	田	正常	0.18	0.56	2.04	0.26	431	89	19	36

品目:モモ / 葉脈間の淡色化

幼葉に現れる(4月上~中)が成葉時期に症状は消える。ハウス栽培のみで発生, 露地栽培ではみられない。



品種:ハウス日川 (台木:おはつ)

発生時期:2005.5.上中旬

葉中無機成分含有量

	P	K	Ca	Mg	Fe	Mn	Zn	B
	----- (%) -----		-----		----- (ppm) -----			
正常葉	0.27	2.16	1.26	0.40	90	64	32	35
軽症葉	0.26	2.08	1.32	0.41	77	77	33	29
重症葉	0.26	1.96	1.17	0.41	86	74	30	28